Strychnin.

Bestandtheile.

Auch dieses Alkaloid ist von den obengenannten Chemikern untersucht worden. Es besteht aus:

Carbon . .	76,22	60 At.	77,83
Azot . . .	8,92	3 —	9,02
Hydrogen .	6,54	30 —	6,36
Oxigen . .	6,38	2 —	6,78

(A. o. a. O.)

Veratrin.

Bestandtheile.

Das Veratrin besteht nach den Herren Pelletier und Dumas aus:

Carbon . .	66,75	30 At.	68,04
Azot . . .	5,04	1 —	5,25
Hydrogen .	8,54	24 —	8,89
Oxigen . .	19,60	3 —	17,80

(A. o. a. O.)

Emetin.

Bestandtheile.

Nach Pelletier und Dumas besteht das Emetin aus:

Carbon . .	64,57	30 At.	64,24
Azot . . .	4,30	1 —	4,96
Hydrogen .	7,77	24 —	8,39
Oxigen . .	22,95	4 —	22,61
	99,59		100,00.

Annales de Chim. et de Phys. XXIV. p. 191.

Das Cafrin (Kaffeſtoff).

Die Beſtandtheile des Cafrins ſind nach Pelletier und Dumas: Beſtandtheile.

Carbon . .	46,51	5 At.	47,97
Azot . . .	21,54	1 —	22,21
Hydrogen .	4,81	3 —	4,72
Oxigen . .	27,14	1 —	25,10
	100,00		100,00.

Annal. de Chim. et de Phys. XXIV. p. 191.